

Okénko zahrádkáře.

První polovina měsíce června byla oproti dlouhodobému normálu teplotně nadprůměrná a srážkově podprůměrná. V prvním červnovém týdnu spadlo 1 až 8 mm dešťových srážek, ojediněle při bouřkách až 30 mm (Braníšovice, Hrádek).

U peckovin, které mají všeobecně vysokou násadu plůdků, probíhá stále fyziologický propad nedokonale opylených plůdků. Jabloně a hrušně mají průměrnou až menší násadu plodů, část stromů má minimální počet, nebo je bez plodů. Po výrazném oteplení v červnu se na ovocných stromech zvyšuje výskyt mšic a u obaleče jablečného dosáhla letová vlna motýlků svého vrcholu. U révy vinné se „celkový stav“ radikálně zlepšil, réva má velké přírůstky letorostů a začal také velký nárůst zálistků, které zahušťují keře révy. Délka letorostů podle lokalit a odrůd dorůstá již do druhého dvojdřátí a réva již začala kvést. Také výskyt svilušek, kadeřavosti a plstnatosti listů díky silnému růstu letorostů a listů radikálně ustoupil.

U jabloní a hrušní je potřebné listovou plochu a mladé plody ošetřit z hlediska ochrany před chorobami a škůdci přípravky proti padlí, strupovitosti a škůdcům, především obaleči jablečnému: Discus 0,02% nebo Zato 50 WG 0,015% nebo Topas 100 EC 0,05% či Luna Experience 0,05% a na savé a žravé škůdce přidat Mospilan 20 SC 0,025% nebo Decis 15 EW 0,07%. U pozdních odrůd třešně ošetřujeme ještě proti monilióze plodů přípravky: Mythos 30 SC 0,25% nebo Thiram Granuflo 0,25% či Teldor 500 SC 0,15%. Révu vinnou ošetřujeme na začátku květenství kombinovanými přípravky s dlouhodobějším účinkem: Melody Combi 65 WG 0,12% nebo Ridomil Gold MZ Pepite 0,25%, na padlí přidáme přípravek Topas 100 EC 0,03%, nebo Falcon 400 EC 0,04% či Sercadis 0,02%.

U ovocných dřevin a vinné révy je vhodné již nyní přidávat do postřiků také listovou výživu či rostlinné stimulatory, které zlepšují výživu rostlin a částečně eliminují špatný příjem živin kořeny. Použijeme k tomu jeden z některých přípravků: Vegaflor, Wuxal, Wuxal Calcium, Harmavit, Ekolist, Krystalon, Biostim, Terra Sorb Foliar, Envistar či Energen Fulhum.

Při aplikaci přípravků je nutné se řídit návodem na obalu přípravku, dle Přehledu registrovaných přípravků a také aktuálními informacemi Rostlinolékařské správy ÚKZÚZ Brno. Další informace získáme na Rostlinolékařském portálu – Agromanual.cz a webových stránkách eAGRI o přípravcích na ochranu rostlin.

Hlavní prací u révy vinné bude prostrkování letorostů do dvojdřátí a vylamování zálistků v zóně květenství. Můžeme při tom ještě vylomit nadbytečné letorosty, které zahušťují střed révového keře. V letošním roce je vysoká násada květenství a můžeme tak současně se zelenými pracemi ještě stále redukovat počet ponechaných květenství, především u stolních odrůd a odrůd s velkým hrozdem.

V tomto velmi suchém období je nutná vydatná záливka mladých ovocných stromů a révových sazenic, abychom podpořili jejich růst. Je vhodné také v okolí kmínku stromku vytvořit mulč z plevelů a trávy, který zabraňuje vysychání povrchu půdy.